

El Mercadillo informa
(Hoja Divulgativa n° 22)

INJERTOS (III)



Enero 2009


♣ INJERTO DE YEMA:

En este tipo se cumplen los mismos principios generales de los injertos siendo fundamental **poner en contacto los "cambium"** y en este caso concreto **nunca** se debe aplicar **cera**. (Ver **Injertos I**)

♣ PASOS PARA REALIZAR UN INJERTO DE YEMA

➤ INJERTO DE ASTILLA O DE "CHIP":

- Este tipo de injerto se realiza en **primavera**, aunque también se puede hacer en **verano**, pero entonces la yema se desarrolla la primavera siguiente.
- Se utiliza en higueras y otros ficus o árboles y arbustos de madera blanda.
- **Preparación del patrón:** se hace un corte en forma de **lengüeta** y otro corte de arriba a abajo de unos 3 o 4 cm.
- **Preparación de la yema:** se debe escoger la yema de una rama tierna del mismo año, realizando un corte de la misma forma que en el patrón, pero sin dejar lengüeta.
- Se coloca el "**chip**" (yema) en el corte del patrón ajustándolo perfectamente y se ata.
- Cuando los brotes del injerto midan de 10 a 15 cm. **se corta el patrón** por encima del injerto.




➤ INJERTO DE ESCUDETE O DE YEMA EN "T":

- Es el más utilizado para **árboles frutales**, injertando la yema de la variedad que interesa en los patrones obtenidos de semilla o de estaca, teniendo un alto porcentaje de prendimiento.
- Se realizan desde la **primavera al otoño**, ya que la corteza se puede despegar fácilmente al estar el árbol en crecimiento activo (fluyendo savia).
- En el caso de **cítricos y rosales**, se hace entrada la **primavera**, brotando la yema el mismo año; si se hace en **verano** se llama "**a ojo durmiente**" ya que ésta brota la primavera del año siguiente
- **Preparación del patrón:** debe tener de 5 a 25 cm. de grosor, haciéndole un corte vertical de unos 2 cm. y luego otro horizontal formando una "T".
- **Preparación de la yema:** Se elige una rama de la variedad a injertar, se corta en forma de **escudo** la yema seleccionada y se coloca el dedo encima de la yema, apretando hacia dentro y girando; si lleva hojas, se corta para evitar que se deshidrate.
- Se despega la corteza del patrón con el cuchillo y se inserta la yema hasta **emparejar los dos cortes horizontales**. Se ata dejando que asome la yema y un trozo del pecíolo.
- Se **desata** una vez prendido, a los 15 o 20 días.



➤ INJERTO DE PARCHES:

- Es más **lento y difícil** que el anterior, pero se usa en **árboles de corteza gruesa**, como el nogal.
- La mejor época va desde **verano a principios de otoño**, ya que la corteza se puede despegar con mayor facilidad.



- **Preparación del patrón:** se pueden insertar en patrones de hasta 10 cm. de grosor, del cual se extrae un **parche rectangular de unos 2,5 cm. de ancho**.

- **Preparación de la yema:** se extraerá de una rama que no sobrepase los 3 cm. de grosor y se realizará un corte de las mismas dimensiones que el del patrón, debiéndose **injertar de inmediato**.

- Se introduce el parche de la yema en el corte realizado en el patrón, que **deberá encajar perfectamente** y se ata dejando por fuera la yema.

- Se **desata** a los **15 días** aproximadamente ya que prende rápido.

- Cuando los brotes del injerto midan de 10 a 15 cm. **se corta el patrón** por encima del injerto.

Técnicos: Miriam Hernández, Teresa Zamora.

✉ perito@mercadillodelagricultor.com